

ФАУНА ЗЕМЦОВОДНЫХ АРМЕНИИ

ЕГИАЗАРЯН Э. М.

Ереванский государственный университет
Армения, 375025 Ереван, ул. Алека Манукяна 1.

eduard@ysu.am

Батрахофауна Армении представлена 8 видами, которые включают два вида хвостатых (*Triturus viridis* – обыкновенный тритон, *T. vittatus* – малоазиатский тритон) и шесть видов бесхвостых (*Pelobates siriacus* – сирийская чеспочница, *Bufo viridis* – зеленая жаба, *Hyla arborea schelkownikovi* –

обыкновенная квакша, *H. savignyi* – малоазиатская квакша, *Rana macrosnemis* – малоазиатская лягушка, *R. ridibunda* – озерная лягушка) земноводных.

Распространение указанных видов на территории республики обусловлено наличием большого количества естественных и искусственных, крупных и мелких водоемов, пригодных для их обитания. Многие виды приспособились к обитанию в антропогенных ландшафтах, которые составляют большую часть их ареала.

Хотя отмеченные виды предъявляют различные требования к местам обитания, однако представителей батрахофауны можно встретить практически во всех водно-болотных угодьях Армении. Последнее объясняется особым географическим положением республики и вертикальной поясностью, вследствие чего здесь представлены почти все географические зоны – от субтропиков до альпийских лугов (от 500 до 3000 м н.у.м.).

Численность представителей подкласса хвостатых земноводных сравнительно невелика. Их распространение ограничивается северными районами республики, пограничными с Грузией, на высоте 1200 м н.у.м. Обыкновенный тритон встречается в широколиственных и смешанных лесах, малоазиатский тритон – также в хвойных.

Сирийская чеспочница встречается в лесных, степных и полупустынных предгорных районах, в центральных и южных районах республики, на высоте 1935 м н.у.м. Наиболее широко распространены озерная лягушка, зеленая жаба и малоазиатская лягушка, хотя численность последней в настоящее время сильно сократилась вследствие нарушения режима местобитаний. Что касается квакш, то численность *H. savignyi* несколько выше, чем *H. arborea schelkownikovi*. Малоазиатская квакша обитает в центральных и южных районах республики, граничащих с Турцией и Ираном, в более сухих местообитаниях, а обыкновенная квакша – в северных районах, во влажных лесных местообитаниях.