

УДК 581.9
582.998.2

НОВЫЕ ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ ИЗ СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ

Глубокоуважаемый редактор!

В процессе изучения флоры и растительности северной Армении был собран довольно большой гербарный материал. При обработке части этих коллекций выяснилось, что нами обнаружены новый для флоры Армении род *Bellis* L. (дикорастущая маргаритка) и некоторые новые виды как для северной Армении, так и для республики в целом.

Bellis perennis L. Обнаружен в двух пунктах: на южных склонах Базумского хребта, в окрестностях станций Памбак, на лугу, 7.4.1984 г., К. Гусян, определила Э. Габриэлян (ЕКЕ 124439), и в устье Заманлу, в пойме реки, на мокром лугу. Этот евро-сибирский вид встречается и на Кипре, в западной Сирии, сравнительно редко в Малой Азии. На Кавказе произрастает в Черкесии, в Азербайджане и в Западном, Центральном и Юго-Западном Закавказье [1—3].

Astragalus campylosema Boiss. Новый для флоры Армении вид. Собран в Гукасянском районе, между сс. Салут и Башгюх, в урочище Байлози дзор, 12.7.1978 г., К. Гусян, определила И. Манденова (ЕКЕ 124444, 124442). Во «Flora of Turkey» Чемберлен и Мэтьюс [4] считают его турецким эндемиком (ближайшие местонахождения вида на территории Турции—Мараш, Эрзинкан, Эрзерум). Однако И. Манденова обнаружила этот астрагал в сборах Л. Хиштибидзе из Ахалкалакского и Ахалцихского районов, точнее в окрестностях с. Аспиндза, по левому берегу р. Куры, и близ Тетроби, что оказывается весьма близко от нашего местонахождения.

Обрабатывая род *Astragalus* для «Флоры Армении» [5], И. Манденова предсказала нахождение этого вида на территории нашей республики.

Myosotis micranta P. Новый вид для северной Армении. Собран в Калининском районе, в окрестностях с. Привольное, на левом берегу речки, 7.5.1980 г., К. Гусян (ЕКЕ 124443). Вид с довольно широким ареалом, произрастает в Средиземноморье, Европе, Западной, Восточной Сибири, Иране. На Кавказе встречается в Предкавказье, Дагестане и Южном Закавказье.

Verbascum soongaricum Schrenk. Новый для северной Армении ирано-туранский вид. Собран в Спитакском районе, между сс. Налбанд и Сараарт, на скалах южного склона Базумского хребта, 10.7.1980 г., К. Гусян, определила Э. Гарибян (ЕКЕ 124429).

Stambe orientalis L. Новый для северной Армении вид. Этот ирано-туранский элемент, широко распространенный в аридных районах юго-западной Азии, на востоке Кавказа, в Закавказье и в Южных районах Армении, обнаружен в Гугарском районе, в окрестностях с. Карадзор, на южном склоне Базумского хребта, на горе Куртали, 15.7.1977 г., К. Гусян (ЕКЕ 124444).

К. В. ГУСЯН

ЛИТЕРАТУРА

1. Гроссгейм А. Определитель растений Кавказа, 1949.
2. Аветисян В. Е. В кн.: Флора Армении, т. 5, Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1966.
3. Grierson A. J. C. in Davis P. H. Flora of Turkey, v. 5, Edinburgh: 1975.
4. Chamberlain B. F. and Matthews V. A. in Davis P. H. Flora of Turkey, v. 3. Edinburgh: 1969.
5. Мандонова И. П. В кн. Флора Армении, т. 5, Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1962.

Կ. Ե. ՀՅՈՒՍԱՆ

ՆՈՐ ՋՂՈՐԻՍՏԱԿԱՆ ՀԱՅՏԵԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԸՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ

Ա մ փ ո փ ու մ

Հոդվածում բերվում են Հայաստանի ֆլորայի համար նոր ցեղ *Bellis* L., որը հավաքված է Ձ տարբեր վայրերից, նոր տեսակ *Astragalus campylosema* Boiss., ինչպես նաև հյուսիսային Հայաստանի ֆլորայի համար նոր երեք տեսակ՝ *Myosotis micrantha* Pall., *Verbascum soongaricum* Schrenk. և *Crambe orientalis* L.: